

IMS Me-Life クリニック 仙台を ご利用された皆さまへ

この度は、当クリニックをご利用いただき誠にありがとうございました。

本日の健診結果報告書は2週間ほどでお送りいたしますので、疾病の早期発見、早期治療の観点からご自身の健康管理にお役立てください。

なお、健診結果報告書により要検査・要精密検査に該当された方、及びご自身の健康状態に不安がある方は、当クリニックにて、診療科のご案内や受診予約などのご相談を承りますのでご一報ください。



当クリニックの系列病院である「イムス明理会仙台総合病院」で受診する場合には、受診時の簡素化や待ち時間の短縮などスムーズにご案内させていただきます。

IMS（イムス）グループは、人間ドックなどの予防医学から、専門医療やリハビリ、療養を主とした病院・介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームを運営し、状態や疾患に合わせた医療・介護を行っています。

お電話かメールでお問い合わせください

イムス ミライフ
IMS Me-Life クリニック 仙台

〒983-8477 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目1-1 JR 仙台イーストゲートビル4階
ホームページ> <https://imgroup.jp/sendai/>

☎ 022-792-5000 ✉ isc-info@ims.gr.jp

お問い合わせ受付時間 > 平日 8:00~17:00 / 土曜日 8:00~12:00 (日祝・年末年始休み)

おねがい
アンケートにご協力ください

本日は IMS Me-Life クリニック 仙台を
ご利用いただき、ありがとうございます。
お疲れのところ誠に恐縮ですが、ご意見
をいただけましたら幸いです。




アンケートは
こちらから



検査後の症状や 注意事項について

この度は当クリニックをご利用いただきましてありがとうございました。

受診された検査項目の注意事項をよくお読みいただき、
不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



イムス ミライフ
IMS Me-Life クリニック 仙台

検査後の症状や注意事項について

採血検査

検査後は、まれに以下の症状がみられる場合がございます

- 採血部位が内出血した場合
穿刺後の圧迫止血不足が主な原因です。一週間ほどで軽快しますが、症状が強くなったときは、最寄りの医療機関をご受診ください。
- 指先の痺れや採血部位の痛みが出た場合
皮膚表層近くの神経は個人差が大きいので、神経損傷を100%防止することは出来ません。通常の採血では、損傷は軽度で症状は軽く、一時的なことがほとんどです。一週間ほどで軽快しますが、症状が強くなったときは、最寄りの医療機関をご受診ください。

胃部 X 線（バリウム）検査

バリウム投与後の副作用として、消化管内にバリウムが停留することにより、まれに消化管に穴が開いたり、腹膜炎などの重篤な症状を引き起こすことが報告されています。また高齢者の方の場合、より重篤な症状を引き起こすことがあります。検査後に出来るだけ早くバリウムを排出させるため、以下の事項にご注意ください。

- 健診終了後、速やかにお渡しした下剤 2 錠を多めの水で飲んでください。
- 食事は普段通りしっかり摂ってください。
- バリウムが排出されるまでは、普段より多めの水分補給（1.5 ～ 2ℓ）をこころがけてください。
- お酒はバリウムが排出されるまでお控えください。
- 下剤の効果には個人差がありますが、バリウムは下剤服用後 2 ～ 6 時間で白っぽい便として出ます。
- 1 回目の下剤服用後、6 時間経っても排便がない場合は 2 回目の下剤を服用してください。

検査後に以下に該当する方は、直ちに最寄りの医療機関を受診してください

- お渡しした下剤をすべて服用しても、健診翌日の午前までに排便がない場合
- お腹が張ったり、腹痛がある場合

バリウムアレルギーについて

バリウム服用の際に副作用でアレルギーが現れる方がいます。バリウムアレルギーの症状が現れた場合は、直ちに最寄りの医療機関を受診してください。

バリウムアレルギーの主な症状

全身、または身体の一部に痒み、じん麻疹、発疹、湿疹、腫れ、むくみなどの皮膚症状や、頭痛、頭重、胃痛、胸焼け、吐き気、腹痛などの消化器症状。また、呼吸困難症状やアナフィラキシー症状を引き起こす危険性も否定は出来ません。

子宮頸部細胞診検査

検査後は、以下にご注意ください

- 出血について
検査上の刺激による、おりものに混じる程度の鮮血・茶色いおりものは通常 2 ～ 3 日で治まります。ただし、2 日以上鮮血の出血が続く場合、検査以外の不調としてポリープやびらんなどの炎症性出血が考えられます。症状が続くときは、最寄りの医療機関をご受診ください。
- 入浴について
検査当日はシャワー浴にしてください。翌日から出血が少なければ入浴できます。心配な方や、温泉・銭湯などは出血が治まってからの方が安心です。
- プールや激しい運動
出血のある間は控えてください。

内視鏡検査

検査後は、以下にご注意ください

- 内視鏡検査を受けられた方共通
検査中、お腹に空気を入れたことにより多少の膨満感、腹痛を感じる事がありますが、ガスが出ると軽減します。ガスが出て改善されない腹痛、発熱、その他喉の痛み、吐血、下血などの症状がありましたら、最寄りの医療機関をご受診ください。
- 経口内視鏡を受けられた方
喉の麻酔の影響が残っている場合がありますので、**検査後ご飲食は 30 分間禁止です。30 分を過ぎましたら、少量の水を飲んでむせない事を確認してから**お取りください。
- 経鼻内視鏡を受けられた方
鼻血が出る場合がありますので、検査当日は鼻を強くかまないで下さい。検査終了後、むせこみがなければご飲食を開始していただけます。

生検をされた方

- 検査後 2 時間はお食事、お飲物を摂らないでください。
- 検査当日はお酒、タバコ、コーヒーなどの刺激物は禁止です。
- 入浴は避け、シャワーにしてください。

これらの他にもわからない事がありましたら、当クリニックまでお問い合わせください

IMS Me-Life クリニック 仙台 **022-792-5000**

お問い合わせ受付時間 〉 平日 8:00～17:00 / 土曜日 8:00～12:00（日祝・年末年始休み）