

横浜旭中央総合病院

新規採用・採用変更・採用中止医薬品のお知らせ

1 新規採用医薬品 2023.9.1 より採用

<内服薬>

- | | | | |
|---|--|----------------|--------------|
| ① | ミネプロ OD錠 1.25 mg | (1.25mg/錠) | (第一三共) |
| | ミネプロ OD錠 2.5 mg | (2.5mg/錠) | (第一三共) |
| | ミネプロ OD錠 5 mg | (5mg/錠) | (第一三共) |
| | 採用区分 | 院外採用 | |
| ② | リバゼブ配合錠 HD (ヒトカスタチンカルシウム 4.0mg・エゼチミブ 10.0mg) | | (興和) |
| | 採用区分 | 院外採用 | |
| ③ | ビムパットトライブロップ 10% | (100mg / g) | (第一三共) |
| | 採用区分 | 小児科井手医師限定 院外採用 | |
| ④ | アスベリンシロップ 0.5% | (5mg / mL) | (ニプロE Sファーマ) |
| | 採用区分 | 院外採用 小児科限定 | |
| ⑤ | カロナールシロップ 2% | (20mg / mL) | (あゆみ製薬) |
| | 採用区分 | 院外採用 小児科限定 | |
| ⑥ | プロカテロール塩酸塩シロップ 5μg/mL「日新」 | (5μg / mL) | (日新製薬) |
| | 採用区分 | 院外採用 小児科限定 | |
| ⑦ | アンブキソール塩酸塩シロップ 小児用 0.3%「タタ」 | (3mg / mL) | (高田製薬) |
| | 採用区分 | 院外採用 小児科限定 | |
| ⑧ | ピートル顆粒分包 250mg | (250mg/包) | (キッセイ薬品工業) |
| | 採用区分 | 透析科限定 院外採用 | |
| ⑨ | タリージェ OD錠 2.5mg | (2.5mg/錠) | (第一三共) |
| | タリージェ OD錠 5mg | (5mg/錠) | (第一三共) |
| | 採用区分 | 院外採用 | |
| ⑩ | モビコール配合内用剤 LD | (6.8523g / 包) | (EAファーマ) |
| | モビコール配合内用剤 HD | (13.7046g / 包) | (EAファーマ) |
| | 採用区分 | 共通採用 | |

<外用薬>

- | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------|
| ① | レクタブル 2 mg注腸フォーム 14回 | (ブデソニド 2 mg/フッシュ) | (EAファーマ) |
| | 採用区分 | 共通採用 | |
| ② | プリピナ液 0.05% 500mL | (0.5mg/mL) | (日新製薬) |
| | 採用区分 | 院内採用 内視鏡室限定 | |
| ③ | リトカイン塩酸塩ヒックス 2%「日新」 100mL | (20mg / mL) | (日新製薬) |
| | 採用区分 | 院内採用 内視鏡室限定 | |

- ④ サルタノールインヘラー100 μ g (18g/缶) (GSK)
 採用区分 検査室のみ (現在は院外採用 do 処方のみ可)
- ⑤ケトプロフェンテープ 40mg「三和」10cm×14cm (7枚/袋) (三和化学)
 採用区分 院外採用

<注射薬>

- ① エンハーツ点滴静注用 100mg (100 mg/バイアル) (第一三共)
 採用区分 共通採用
 付帯要件 板橋中央総合病院との契約が締結され次第、使用開始可

2 採用切替医薬品 在庫無くなり次第切替

<内用薬>

- 採用** エプレレノン錠 50mg「杏林」 (50mg/錠) (杏林製薬)
 中止 セララ錠 50mg (50mg/錠) (ウヰアトリス製薬)
 採用区分 共通採用
- 採用** 酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」 (25mg/錠) (沢井製薬)
採用 酢酸亜鉛錠 50mg「サワイ」 (50mg/錠) (沢井製薬)
 中止 ノベルジン錠 25mg (25mg/錠) (ノーベルファーマ)
 中止 ノベルジン錠 50mg (50mg/錠) (ノーベルファーマ)
 採用区分 25mg 共通採用 50mg 院外採用
- 採用** ビソップロロール fumarate 酸塩錠 0.625mg「日医工」 (0.625mg/錠) (日医工)
採用 ビソップロロール fumarate 酸塩錠 2.5mg「日医工」 (2.5mg/錠) (日医工)
 中止 ビソップロロール fumarate 酸塩錠 0.625mg「サワイ」 (0.625mg/錠) (沢井製薬)
 中止 ビソップロロール fumarate 酸塩錠 2.5mg「サワイ」 (2.5mg/錠) (沢井製薬)
 採用区分 共通採用
- 採用** モンテルカスト細粒 4mg「ケミファ」 (4mg/包) (日本ケミファ)
 中止 モンテルカスト細粒 4mg「サワイ」 (4mg/包) (沢井製薬)
 採用区分 共通採用
- 採用** フルボキサミン maleate 酸塩錠 25mg「アメル」 (25mg/錠) (共和薬工)
 中止 フルボキサミン maleate 酸塩錠 25mg「杏林」 (25mg/錠) (杏林製薬)
 採用区分 共通採用
- 採用** ケトチフェンカプセル 1mg「サワイ」 (1mg/Cap) (沢井製薬)
 中止 ケトチフェンカプセル 1mg「トーワ」 (1mg/Cap) (東和薬品)
 採用区分 院外採用
- 採用** トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg「NIG」 (2mg/錠) (武田薬品工業)
 中止 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg「タイヨー」 (2mg/錠) (武田テバファーマ)
 採用区分 共通採用

<外用薬>

採用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 μ g 「杏林」 56 噴霧用 (56 噴霧/キット) (杏林製薬)
中止 アラミスト点鼻液 27.5 μ g 56 噴霧用 (56 噴霧/キット) (G S K)

採用区分 共通採用

採用 ツロブテロールテープ 0.5mg 「QQ」 (0.5mg / 枚) (武田薬品工業)

採用 ツロブテロールテープ 1mg 「QQ」 (1mg / 枚) (武田薬品工業)

採用 ツロブテロールテープ 2mg 「QQ」 (2mg / 枚) (武田薬品工業)

中止 ツロブテロールテープ 0.5mg 「日医工」 (0.5mg / 枚) (日医工)

中止 ツロブテロールテープ 1mg 「日医工」 (1mg / 枚) (日医工)

中止 ツロブテロールテープ 2mg 「日医工」 (2mg / 枚) (日医工)

採用区分 共通採用

<注射薬>

採用 アルブトロハン HI 注 10mg/2mL 「フナー」 (10mg / 管) (扶桑薬品工業)

中止 スロンソ HI 注 10mg/2mL (10mg / 管) (アルフレッサ ファーマ)

採用区分 透析科・腎臓内科限定

採用 セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」 (1g / 瓶) (ケミックス)

中止 セフェピム塩酸塩静注用 1g 「サンド」 (1g / 瓶) (サンド)

採用区分 共通採用

採用 メロペネム点滴静注用 0.5g 「トーフ」 (0.5g / 瓶) (東和薬品)

中止 メロペネム点滴静注用 0.5g 「明治」 (0.5g/瓶) (MeijiSeika ファルマ)

採用区分 共通採用

採用 グラニセトロン静注液 1mg 「サワイ」 (1mg / 管) (沢井製薬)

中止 グラニセトロン静注液 1mg 「日医工」 (1mg / 管) (日医工)

採用区分 共通採用 麻酔科限定

採用 ピペラシリン Na 注射用 2g 「NIG」 (2g / 瓶) (武田薬品工業)

中止 ピペラシリンナトリウム注射用 2g 「日医工」 (2g / 瓶) (日医工)

採用区分 共通採用

採用 ブスコパン注 20mg (20mg / 管) (サノフィ)

中止 ブチルスコポラミン臭化物注 20mg 「日医工」 (20mg / 管) (日医工)

採用区分 共通採用

採用 硝酸イソソルビド注 50mg/100mL 「タカタ」 (50mg / 瓶) (高田製薬)

中止 硝酸イソソルビド注 100mg/100mL 「タカタ」 (100mg / 瓶) (高田製薬)

採用区分 共通採用

採用 アルブロスタジールアルファテックス注射用 20 μ g 「タカタ」 (20 μ g / 管) (高田製薬)

中止 アルブロスタジールアルファテックス注射用 20 μ g 「F」 (20 μ g/管) (富士製薬工業)

採用区分 共通採用

3 採用中止医薬品 在庫無くなり次第終了

理由：販売中止にて

クロモグリク酸 Na 点鼻液 2% 「杏林」 (院外)

理由：期限切れを繰り返すため

アルト原末(500mg)

理由：新規採用に伴う削除対象

タリージェ錠 2.5mg/5mg (院外)

プレドネマ注腸 20mg (共通用時)

4 採用医薬品の区分変更 在庫無くなり次第切替

<共通採用 ⇒ 共通採用 用時購入>

理由：対象患者が減ってきているため

アブラキサシ点滴静注用 100mg

<共通採用 用時購入 ⇒ 共通採用>

理由：対象患者が増えてきているため

パージェタ点滴静注用 420mg

理由：速やかに使用したいと糖尿病内科より要望あったため

コートロシン注射用 0.25mg

<糖尿病内科限定 用時購入 ⇒ 糖尿病内科限定 常時在庫>

理由：処方量が以前より増えたため

ビクトーザ皮下注 18mg